

ID

氏名

年齢

科名

病棟

Neoadjuvant or Adjuvant
TIP療法

3～4週毎 コース予定

疾患名 陰茎癌

主治医 指導医

スケジュール

HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()

		day1	day2	day3
パクリタキセル	175 mg/m ²	↓		
イホマイド(イホスファミド)	1.2 g/m ²	↓	↓	↓
シスプラチン	25 mg/m ²	↓	↓	↓
ウロミテキサン(メスナ)	240 mg/m ² /回	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓

【注意】 * パクリタキセルはインラインフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を使用し、
DEHPフリー点滴セットを使用すること。

- * アルコール過敏 有 ・ 無
 - * 1日の尿量が3000 mL以上になるように化学療法開始前日より輸液を行う。
 - * 必要時、補液にメイロンを混注して尿量を確保する。
 - * イホスファミド投与時は出血性膀胱炎予防目的でメスナを点滴する。
- メスナの1回投与量は、イホスファミド1日投与量の20%量とする。

- * シスプラチンは遮光のこと

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

Day 1	抗がん薬投与1時間半前にアプレピタントカプセル (125 mg) 10を内服		
① 生食 500 mLで血管確保			維持(20 mL/時間)
② レスタミン錠(10 mg) 5錠			内服
③ デキサメタゾン 16.5 mg + ファモチジン 20 mg + 生食 20 mL	側管静注		
④ パクリタキセル	+ 生食 500 mL		点滴静注180分(167 mL/時間)
⑤ パロノセトロン 0.75mg	+ 生食 100 mL		点滴静注30分(200 mL/時間)

- | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|
| ⑥ ウロミテキサン | | 側管静注 イホスファミド開始時(1回目) |
| ⑦ イホマイド | + 生食 500 mL | 点滴静注120分(250 mL/時間) |
| ⑧ ソルデム3A 500mL | | 点滴静注90分(333 mL/時間) |
| ⑨ マンニット 300mL | | 点滴静注30分(600 mL/時間) |
| ⑩ シスプラチン | + 生食 400 mL | 点滴静注120分(250 mL/時間) |
| * 生食 100 mLを輸液から前もって抜いておく | | |
| ⑪ ウロミテキサン | | 側管静注 イホスファミド開始4時看護(2回目) |
| ⑫ ソルデム3A 500mL | | 点滴静注120分(250 mL/時間) |
| ⑬ 生食 500mL | | 点滴静注5時間(100 mL/時間) |
| * 尿量をみて補液を追加 | | |
| ⑭ ウロミテキサン | | 側管静注 イホスファミド開始8時看護(3回目) |
| ⑮ オランザピン 5 mg 1錠 1×タ 内服(※糖尿病患者は禁忌) | | |

Day 2 - 3

- | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------------|
| ① 生食 500 mLで血管確保 | | 維持(20 mL/時間) |
| ② デキサメタゾン 6.6 mg | + 生食 100 mL | 点滴静注30分(200 mL/時間) |
| ③ ウロミテキサン | | 側管静注 イホスファミド開始時(1回目) |
| ④ イホマイド | + 生食 500 mL | 点滴静注120分(250 mL/時間) |
| ⑤ ソルデム3A 500mL | | 点滴静注90分(333 mL/時間) |
| ⑥ マンニット 300mL | | 点滴静注30分(600 mL/時間) |
| ⑦ シスプラチン | + 生食 400 mL | 点滴静注120分(250 mL/時間) |
| * 生食 100 mLを輸液から前もって抜いておく | | |
| ⑧ ウロミテキサン | | 側管静注 イホスファミド開始4時看護(2回目) |
| ⑨ ソルデム3A 500mL | | 点滴静注120分(250 mL/時間) |
| ⑩ 生食 500mL | | 点滴静注5時間(100 mL/時間) |

＊ 尿量をみて補液を追加

⑪ ウロミテキサン

側管静注 イホスファミド開始8時看護(3回目)

Day 2 , 3 アプレピタントカプセル(80mg) 1C 1× 朝 内服

Day 2 - 4 オランザピン 5 mg 1錠 1×タ 内服(※糖尿病患者は禁忌)

Day 4 , 5 デキサメタゾン 4 mg 2錠 2×朝昼 内服

	コース			コース		
	day1	day2	day3	day1	day2	day3
月 日	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓			↓		
イホマイド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
シスプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース			コース		
	day1	day2	day3	day1	day2	day3
月 日	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓			↓		
イホマイド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
シスプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						

	コース			コース		
	day1	day2	day3	day1	day2	day3
月 日	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル 開始時刻	↓			↓		
イホマイド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
シスプラチン 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓
確認						