

【BS】インフリキシマブ療法(クローン病) [5 mg/kg]

ID		
氏名		
年齢		
科名	消化器内科	病棟

【BS】インフリキシマブ療法 (クローン病)

[5 mg/kg]

疾患名 クローン病

主治医 _____ 指導医 _____ HBs抗原()、HBs抗体()、HBc抗体()、HCV抗体()

スケジュール

	初回	2週目	6週目	(14週目)	(22週目)
インフリキシマブ BS	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
5 mg/kg	↓	↓	↓	↓	↓
※4回目以降、増量・投与間隔短縮が可能					

- 【注意】 * 初回投与後、2週、6週に投与し、以後8週間間隔で投与
* 6週(3回目)の投与以後、効果減弱した場合には1回10mg/kgで投与可能
(登録レジメン:[増量:10mg/kg]を使用)
* 投与間隔短縮の場合、5mg/kgを最短4週間間隔で投与
* 初回投与及び2週、6週は入院で実施
* 1.2 μ m以下のインラインフィルターを通して投与すること

☆通常より減量する際の理由☆

(レジメン)

《1 - 3回目》

- ① 生食500mL にて血管確保 維持 (20 mL/時間)
- ② ソル・コーテフ 100mg + 生食 20mL 静注
- ③ インフリキシマブBS + 生食 250mL
☆ 輸液ポンプにて10 mL/時間で点滴静注
- ④ 10 mL/時間で15分間点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
☆ 輸液ポンプにて60 mL/時間で点滴静注
- ⑤ 60 mL/時間で15分間点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
☆ 輸液ポンプにて120 mL/時間で終了まで点滴静注

《4回目以降》

- ① 生食500mLにて血管確保 維持 (20 mL/時間)
- ② ソル・コーテフ 100mg + 生食 20mL 静注
- ③ インフリキシマブBS + 生食 250mL
 - ☆ 輸液ポンプにて100 mL/時間で点滴静注
- ④ 100 mL/時間で15分間点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
 - ☆ 輸液ポンプにて300 mL/時間で終了まで点滴静注

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
開始時刻								
確認								

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
開始時刻								
確認								

	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース	コース
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
開始時刻								
確認								