

アバタセプト療法

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

# アバタセプト療法

疾患名 関節リウマチ

主治医 \_\_\_\_\_ 指導医 \_\_\_\_\_ HBs 抗原( + - ) HBc 抗体( + - ) HCV 抗体( + - )  
スケジュール

	初回	2週目	4週目	8週目	12週目
	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
オレンシア(アバタセプト)	↓	↓	↓	↓	↓

【注意】 \* 添付されたシリコーン油を塗布していない専用のディスポーザブルシリンジ及び 18~21G の注射針を使用して、本剤 1 バイアル当たり 10mL の生理食塩水で溶解する。  
\* 1.2 ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。  
\* 初回投与後、2 週、4 週に投与し、以後 4 週間隔で投与。

(投与量)

オレンシア	通常量 : 60kg 未満	500mg (2 バイアル)
	60kg 以上 100kg 以下	750mg (3 バイアル)
	100kg を超える	1000mg (4 バイアル)

体重 (            ) kg    ⇒    投与量(            )mg

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

- ① 生食 250 mL で血管確保
  - ② オレンシア                    + 生食 100mL                    点滴静注 30 分(200mL/時間)
- 状態に変化がなければ終了

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
月日	/	/	/	/	/	/
オレンシア 開始時刻						
確認						

アバタセプト療法

	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
月日	/	/	/	/	/	/
オレンシア 開始時刻						
確認						

	13回目	14回目	15回目	16回目	17回目	18回目
月日	/	/	/	/	/	/
オレンシア 開始時刻						
確認						

	19回目	20回目	21回目	22回目	23回目	24回目
月日	/	/	/	/	/	/
オレンシア 開始時刻						
確認						

	25回目	26回目	27回目	28回目	29回目	30回目
月日	/	/	/	/	/	/
オレンシア 開始時刻						
確認						

	31回目	32回目	33回目	34回目	35回目	36回目
月日	/	/	/	/	/	/
オレンシア 開始時刻						
確認						