

| | |
|----|----|
| ID | |
| 氏名 | |
| 年齢 | |
| 科名 | 病棟 |

インフリキシマブ療法(ベーチェット病)

[5mg/kg]

疾患名 ベーチェット病(腸管型・神経型・血管型)

主治医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

| | | | | | | |
|------------------|---------|-----|-----|-----|------|--------------|
| | | 初回 | 2週目 | 6週目 | 14週目 | 22週目 |
| レミケード (インフリキシマブ) | 5 mg/kg | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| | | | | | | *4回目以降、増量が可能 |

- 【注意】 * 初回投与後、2週、6週に投与し、以後8週間間隔で投与
 * 6週目(3回目)の投与以後、効果減弱した場合には1回10mg/kgで投与可能
 (登録レジメン:[増量:10mg/kg]を使用)。
 * 初回投与は入院で実施
 * 1.2ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

《1 - 3回目》

- ① 生食 500mL にて血管確保 維持 (20 mL/時間)
- ② 《レミケード投与前》 ソル・コーテフ 100mg + 生食 20mL 静注
- ③ レミケード + 生食 250mL
 - ☆ 輸液ポンプにて 10 mL/時間で点滴静注
- ④ 10 mL/時間で 15 分間点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
 - ☆ 輸液ポンプにて 60 mL/時間で点滴静注
- ⑤ 60 mL/時間で 15 分間点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
 - ☆ 輸液ポンプにて 120 mL/時間で終了まで点滴静注

《4回目以降》

- ① 生食 500mL にて血管確保 維持 (20 mL/時間)
- ② 《レミケード投与前》 ソル・コーテフ 100mg + 生食 20mL 静注
- ③ レミケード + 生食 250mL
 - ☆ 輸液ポンプにて 100 mL/時間で点滴静注
- ④ 100 mL/時間で 15 分間点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ
 - ☆ 輸液ポンプにて 300 mL/時間で終了まで点滴静注

| | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 | 4 回目 | 5 回目 | 6 回目 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 月日 | / | / | / | / | / | / |
| レミケード 開始時刻 | | | | | | |
| 確認 | 入院 | | | | | |

| | 7 回目 | 8 回目 | 9 回目 | 10 回目 | 11 回目 | 12 回目 |
|---------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 月日 | / | / | / | / | / | / |
| レミケード 開始時刻 | | | | | | |
| 確認 | | | | | | |

| | 13 回目 | 14 回目 | 15 回目 | 16 回目 | 17 回目 | 18 回目 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 月日 | / | / | / | / | / | / |
| レミケード 開始時刻 | | | | | | |
| 確認 | | | | | | |

| | 19 回目 | 20 回目 | 21 回目 | 22 回目 | 23 回目 | 24 回目 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 月日 | / | / | / | / | / | / |
| レミケード 開始時刻 | | | | | | |
| 確認 | | | | | | |