

【BS】インフリキシマブ療法(ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎)

ID
氏名
年齢
科名 眼科

## 【BS】インフリキシマブ療法【眼科】

疾患名

ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎

主治医 \_\_\_\_\_ HBs 抗原( + - ) HBc 抗体( + - ) HCV 抗体( + - )

スケジュール

		初回	2週目	6週目	14週目	22週目
		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
インフリキシマブ BS	5 mg/kg	↓	↓	↓	↓	↓

【注意】\*初回投与後、2週、6週に投与し、以後8週間間隔で投与

\*初回投与は入院で実施すること

\*1.2 μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

《1 - 3回目》

- ① 生食 500 mL にて血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② 《インフリキシマブ BS 投与前》 ソル・コーテフ 100 mg + 生食 20 mL 静注
- ③ インフリキシマブ BS + 生食 250 mL  
  - ☆輸液ポンプにて 10 mL/時間で点滴静注
- ④ 10 mL/時間で 15 分間点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ  
  - ☆輸液ポンプにて 60 mL/時間で点滴静注
- ⑤ 60 mL/時間で 15 分間点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ  
  - ☆輸液ポンプにて 120 mL/時間で終了まで点滴静注

【BS】インフリキシマブ療法(ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎)

《4回目以降》

- ① 生食 500 mL にて血管確保 維持(20 mL/時間)
- ② 《インフリキシマブ BS 投与前》 ソル・コーテフ 100 mg + 生食 20 mL 静注
- ③ インフリキシマブ BS + 生食 250 mL  
 ☆輸液ポンプにて 100 mL/時間で点滴静注
- ④ 100 mL/時間で 15 分間点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ  
 ☆輸液ポンプにて 300 mL/時間で終了まで点滴静注

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
月日	/	/	/	/	/	/
開始時刻						
確認	入院					

	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
月日	/	/	/	/	/	/
開始時刻						
確認						

	13回目	14回目	15回目	16回目	17回目	18回目
月日	/	/	/	/	/	/
開始時刻						
確認						

	19回目	20回目	21回目	22回目	23回目	24回目
月日	/	/	/	/	/	/
開始時刻						
確認						