

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

【BS】インフリキシマブ療法

【強直性脊椎炎】

疾患名 強直性脊椎炎

主治医 _____ 指導医 _____ HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

		初回	2 週目	6 週目	12～14 週目
		1 回目	2 回目	3 回目	4 回目
インフリキシマブ BS	5 mg/kg	↓	↓	↓	↓
		* 4 回目以降、6～8 週毎			

【注意】* 初回投与後、2 週目、6 週目に投与し、以後 6～8 週間間隔で投与。

* 1.2 ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

《1 - 3回目》

① 生食 500 mL にて血管確保 維持 (20 mL/時間)

② インフリキシマブ BS 投与前

抗ヒスタミン薬(_____) (_____)錠 内服

カロナール錠 500 mg (_____)錠 または NSAIDs(_____) (_____)錠 内服

③ インフリキシマブ BS + 生食 250mL

☆ 輸液ポンプにて 10 mL/時間で点滴静注

④ 10 mL/時間で 15 分間点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

☆ 輸液ポンプにて 60 mL/時間で点滴静注

⑤ 60 mL/時間で 15 分間点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

☆ 輸液ポンプにて 120 mL/時間で終了まで点滴静注

《4回目以降》

① 生食 500 mL にて血管確保 維持 (20 mL/時間)

② インフリキシマブ BS 投与前

抗ヒスタミン薬() ()錠 内服

カロナール錠 500 mg ()錠 または NSAIDs薬() ()錠 内服

③ インフリキシマブ BS + 生食 250mL

☆ 輸液ポンプにて 100 mL/時間で点滴静注

④ 100 mL/時間で 15 分間点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

☆ 輸液ポンプにて 300 mL/時間で終了まで点滴静注

	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	5 回目	6 回目
月日	/	/	/	/	/	/
開始時刻						
確認						

	7 回目	8 回目	9 回目	10 回目	11 回目	12 回目
月日	/	/	/	/	/	/
開始時刻						
確認						

	13 回目	14 回目	15 回目	16 回目	17 回目	18 回目
月日	/	/	/	/	/	/
開始時刻						
確認						

	19 回目	20 回目	21 回目	22 回目	23 回目	24 回目
月日	/	/	/	/	/	/
開始時刻						
確認						