

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

ABO 不適合生体腎移植 Rituximab 療法

2 週毎 コース予定

疾患名 ABO 不適合生体腎移植

主治医 指導医 HBs 抗原(+ -) HBc 抗体(+ -) HCV 抗体(+ -)

スケジュール

	day 1
リツキサンのリツキシマブ (200 mg/body)	↓

【注意】 * 体温・脈拍・血圧測定・SpO2 測定は up 直前におこなうこと

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

① カロナール(200 mg) _____ 錠 ポララミン(2 mg) _____ 錠 内服

☆30 分後より

② 生食 500 mL にて血管確保 _____ 維持 (20 mL/時間)

③ リツキサンの 200 mg + 生食 180 mL (10 倍希釈)

*前もって生食 250 mL から 70 mL を抜いておく

◎ 輸液ポンプにて 25 mL/時間で点滴静注

④ 25 mL/時間で 1 時間点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎ 輸液ポンプにて 100 mL/時間で点滴静注

⑤ 100 mL/時間で 1 時間点滴静注した後、患者の状態に変化がなければ

◎ 輸液ポンプにて 200 mL/時間で点滴静注

日時	/
リツキサンの開始時刻	
確認	