

ベリムマブ療法

ID	
氏名	
年齢	
科名	病棟

# ベリムマブ療法

疾患名 全身性エリテマトーデス

主治医 \_\_\_\_\_ 指導医 \_\_\_\_\_ HBs 抗原( + - ) HBc 抗体( + - ) HCV 抗体( + - )  
スケジュール

		初回	2週目	4週目	8週目	12週目	...
		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	...
ベンリスタ (ベリムマブ)	10 mg/kg	↓	↓	↓	↓	↓	...

【注意】 \*1Vあたり、規定量の注射用水で溶解すること。

\*初回投与後、2週、4週に投与し、以後4週間隔で投与すること。

☆通常量より減量する際の理由☆

(レジメン)

- ① 生食 250 mL で血管確保
  - ② ベンリスタ + 注射用水 適量 + 生食 250 mL 点滴静注 60分
- 状態に変化がなければ終了

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
月日	/	/	/	/	/	/
ベンリスタ 開始時刻						
確認						

	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
月日	/	/	/	/	/	/
ベンリスタ 開始時刻						
確認						

ベリムマブ療法

	13回目	14回目	15回目	16回目	17回目	18回目
月日	/	/	/	/	/	/
ベンリスタ 開始時刻						
確認						

	19回目	20回目	21回目	22回目	23回目	24回目
月日	/	/	/	/	/	/
ベンリスタ 開始時刻						
確認						

	25回目	26回目	27回目	28回目	29回目	30回目
月日	/	/	/	/	/	/
ベンリスタ 開始時刻						
確認						

	31回目	32回目	33回目	34回目	35回目	36回目
月日	/	/	/	/	/	/
ベンリスタ 開始時刻						
確認						