

ID
氏名
年齢
科名
病棟

DCyBorD (Dara皮下注) 療法

4 週毎 コース予定

疾患名 全身性ALアミロイドーシス

主治医 指導医 HBs抗原(+ -)、HBc抗体(+ -)、HCV抗体(+ -)

スケジュール

【1-2 コース目:1 サイクル 28 日間】

《注射》		day 1	day 8	day 15	day 22
ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800 mg/body	↓	↓	↓	↓
ベルケイド(ボルテゾミブ)	1.3 mg/m ²	↓	↓	↓	↓
《内服》		day 2	day 9	day 16	day 23
デカドロン(デキサメタゾン)	20 mg/body	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓
エンドキサン(シクロホスファミド)	300 mg/m ²	↓	↓	↓	↓

【3-6 コース目:1 サイクル 28 日間】

《注射》		day 1	day 8	day 15	day 22
ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800 mg/body	↓		↓	
ベルケイド(ボルテゾミブ)	1.3 mg/m ²	↓	↓	↓	↓
《内服》		day 2		day 16	
デカドロン(デキサメタゾン)	20 mg/body	↓ ↓		↓ ↓	
	40 mg/body		↓		↓
エンドキサン(シクロホスファミド)	300 mg/m ²	↓	↓	↓	↓

【7 コース目以降:1 サイクル 28 日間】

《注射》		day 1
ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800 mg/body	↓
《内服》		
デカドロン(デキサメタゾン)	20 mg/body	↓

【注意】 * ダラツムマブのインフュージョンリアクション発現時間の中央値が約 4 時間のため、皮下投与終了後 3~4 時間は症状発現に注意すること


* 慢性閉塞性肺疾患もしくは気管支喘息のある患者又はそれらの既往歴のある患者の場合、本剤投与後処置として気管支拡張薬、吸入ステロイドの投与を考慮すること

* ST合剤やアシクロビル等の内服を考慮すること


* 75 歳を超えるまたは過少体重(BMI:18.5 未満)の場合、デキサメタゾンは 20 mg/週に減量可能とする

DCyBorD (Dara皮下注) 療法

- * シクロホスファミドの服用量は体表面積により算出し、50 mg単位で切り捨てる
- * シクロホスファミドの用量は500 mg/週を超えないこと
- * ダラツムマブ・ボルテゾミブは、毎回同じ部位に皮下注射することがないように注射部位をローテートする



ベルケイド投与部位



ダラキューロ投与部位

通常量より減量する際の理由

(レジメン)

【1 コース目】

day 1

- | | | |
|---|------------------------|--------------|
| ① | 生食 500 mLにて血管確保 | 維持(20 mL/時間) |
| ② | デカドロン 4 mg 5 錠 | 内服 |
| | レスタミン 10 mg 5 錠 | 内服 |
| | カロナール 500 mg 2 錠 | 内服 |
| | モンテルカスト 10 mg 1 錠 | 内服 |
| | <u>☆ 1 時間後より</u> | |
| ③ | ダラキューロ 1800 mg (15 mL) | 皮下注(約 3~5 分) |
| ④ | ベルケイド + 生食 適量 | 皮下注 |

*ベルケイドは 1 バイアルを生食 1.2 mLに溶解後 (2.5 mg/mL)、必要量 () mLを抜きとる

day 8, 15, 22

- ① デカドロン 4 mg 5 錠 内服
レスタミン 10 mg 5 錠 内服
カロナール 500 mg 2 錠 内服
モンテルカスト 10 mg 1 錠 内服
☆ 1 時間後より
- ② ダラキューロ 1800 mg (15 mL) 皮下注(約 3~5 分)
- ③ ベルケイド + 生食 適量 皮下注

*ベルケイドは 1 バイアルを生食 1.2 mLに溶解後 (2.5 mg/mL)、必要量 () mLを抜きとる

day 1, 8, 15, 22

エンドキサン 内服

day 2, 9, 16, 23

デカドロン 20 mg 内服

【2 コース目】

day 1, 8, 15, 22

- ① デカドロン 4 mg 5 錠 内服
レスタミン 10 mg 5 錠 内服
カロナール 500 mg 2 錠 内服
☆ 30 分後より
- ② ダラキューロ 1800 mg (15 mL) 皮下注(約 3~5 分)
- ③ ベルケイド + 生食 適量 皮下注

*ベルケイドは 1 バイアルを生食 1.2 mLに溶解後 (2.5 mg/mL)、必要量 () mLを抜きとる

day 1, 8, 15, 22

エンドキサン 内服

day 2, 9, 16, 23

デカドロン 20 mg 内服

【3 - 6 コース目】

day 1, 15

- ① デカドロン 4 mg 5 錠 内服
レスタミン 10 mg 5 錠 内服
カロナール 500 mg 2 錠 内服
☆ 30 分後より
 - ② ダラキューロ 1800 mg (15 mL) 皮下注(約 3~5 分)
 - ③ ベルケイド + 生食 適量 皮下注
- *ベルケイドは 1 バイアルを生食 1.2 mLに溶解後 (2.5 mg/mL)、必要量 () mLを抜きとる

day 8, 22

- ① ベルケイド + 生食 適量 皮下注
- *ベルケイドは 1 バイアルを生食 1.2 mLに溶解後 (2.5 mg/mL)、必要量 () mLを抜きとる

day 1, 8, 15, 22 エンドキサン 内服

day 2, 16 デカドロン 20 mg 内服

day 8, 22 デカドロン 40 mg 内服

【7 コース目以降】

day 1

- ① デカドロン 4 mg 5 錠 内服
レスタミン 10 mg 5 錠 内服
カロナール 500 mg 2 錠 内服
☆ 30 分後より
- ② ダラキューロ 1800 mg (15 mL) 皮下注(約 3~5 分)

	1 コース目				2 コース目			
	day 1	day 8	day 15	day 22	day 1	day 8	day 15	day 22
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
ダラキューロ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ベルケイド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

	3 コース目				4 コース目			
	day 1	day 8	day 15	day 22	day 1	day 8	day 15	day 22
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
ダラキューロ 開始時刻	↓		↓		↓		↓	
ベルケイド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

	5 コース目				6 コース目			
	day 1	day 8	day 15	day 22	day 1	day 8	day 15	day 22
月 日	/	/	/	/	/	/	/	/
ダラキューロ 開始時刻	↓		↓		↓		↓	
ベルケイド 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

※ 7 コース目以降

	コース目	コース目	コース目	コース目	コース目	コース目
月 日	/	/	/	/	/	/
ダラキューロ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓

	コース目	コース目	コース目	コース目	コース目	コース目
月 日	/	/	/	/	/	/
ダラキューロ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓

	コース目	コース目	コース目	コース目	コース目	コース目
月 日	/	/	/	/	/	/
ダラキューロ 開始時刻	↓	↓	↓	↓	↓	↓