

| 項目名称               |           | 検査室 | 容器名称            | 検体量                 | 所要<br>日数 | 注意事項                                   | 測定方法                                                | 基準値範囲                   |           | 単位名称                |
|--------------------|-----------|-----|-----------------|---------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|
|                    |           |     |                 |                     |          |                                        |                                                     | (男)                     | (女)       |                     |
| 血算                 | WBC       | 血液  | 紫EK             | 2mL<br>微量用採血管は500μL | 1日       |                                        | 半導体レーザーを使用したフローサイトメトリー法                             | 3.3-8.6                 | 3.3-8.6   | 10 <sup>3</sup> ／μL |
|                    | RBC       |     |                 |                     | 1日       |                                        | シースフローDC検出法                                         | 4.35-5.55               | 3.86-4.92 | 10 <sup>6</sup> ／μL |
|                    | Hb        |     |                 |                     | 1日       |                                        | SLS-ヘモグロビン法                                         | 13.7-16.8               | 11.6-14.8 | g/dL                |
|                    | Ht        |     |                 |                     | 1日       |                                        | シースフローDC検出法                                         | 40.7-50.1               | 35.1-44.4 | %                   |
|                    | MCV       |     |                 |                     | 1日       |                                        | 計算値                                                 | 83.6-98.2               | 83.6-98.2 | fL                  |
|                    | MCH       |     |                 |                     | 1日       |                                        | 計算値                                                 | 27.5-33.2               | 27.5-33.2 | pg                  |
|                    | MCHC      |     |                 |                     | 1日       |                                        | 計算値                                                 | 31.7-35.3               | 31.7-35.3 | g/dL                |
|                    | Plt       |     |                 |                     | 1日       |                                        | シースフローDC検出法 (PLT-I)、半導体レーザーを使用したフローサイトメトリー法 (PLT-F) | 158-348                 | 158-348   | 10 <sup>3</sup> ／μL |
|                    | IPF       |     |                 |                     |          | 1日                                     |                                                     | 半導体レーザーを使用したフローサイトメトリー法 | *         | *                   |
| 網赤血球               |           | 血液  | 紫EK             |                     | 1日       |                                        | 半導体レーザーを使用したフローサイトメトリー法                             | 0.5-2.5                 | 0.5-2.5   | %                   |
| 血液像／白血球機器分類        | Band      | 血液  | 紫EK             | 2日                  |          |                                        | 鏡検法                                                 | 0.5-6.5                 | 0.5-6.5   | %                   |
|                    | Seg(Neut) |     |                 |                     |          |                                        | 鏡検法・半導体レーザーを使用したフローサイトメトリー法                         | 38.0-74.0               | 38.0-74.0 | %                   |
|                    | Lympho    |     |                 |                     |          |                                        |                                                     | 16.5-49.5               | 16.5-49.5 | %                   |
|                    | Mono      |     |                 |                     |          |                                        |                                                     | 2.0-10.0                | 2.0-10.0  | %                   |
|                    | Eosino    |     |                 |                     |          |                                        |                                                     | 0.0-8.5                 | 0.0-8.5   | %                   |
|                    | Baso      |     |                 |                     |          |                                        |                                                     | 0.0-2.5                 | 0.0-2.5   | %                   |
| RBC／胸水             |           | 血液  | 紫EK             | 2mL                 | 1日       |                                        | シースフローDC検出法                                         | *                       | *         | 10 <sup>6</sup> ／μL |
| Hb／胸水              |           | 血液  | 紫EK             |                     | 1日       |                                        | SLS-ヘモグロビン法                                         | *                       | *         | g/dL                |
| Ht／胸水              |           | 血液  | 紫EK             |                     | 1日       |                                        | シースフローDC検出法                                         | *                       | *         | %                   |
| RBC／腹水             |           | 血液  | 紫EK             | 2mL                 | 1日       |                                        | シースフローDC検出法                                         | *                       | *         | 10 <sup>6</sup> ／μL |
| Hb／腹水              |           | 血液  | 紫EK             |                     | 1日       |                                        | SLS-ヘモグロビン法                                         | *                       | *         | g/dL                |
| Ht／腹水              |           | 血液  | 紫EK             |                     | 1日       |                                        | シースフローDC検出法                                         | *                       | *         | %                   |
| 好中球Alp             |           | 血液  | 紫EK             | 2mL                 | 2日       | 要予約<br>直ちに手渡し提出                        | 鏡検法 (朝長法)                                           | *                       | *         |                     |
| Score              |           |     |                 |                     | 2日       |                                        | 鏡検法 (朝長法)                                           | 156-271                 | 183-334   |                     |
| Rate               |           |     |                 |                     | 2日       |                                        | 鏡検法 (朝長法)                                           | 60.5-99.5               | 67.5-99.5 | %                   |
| 可溶性IL-2R           |           | 血液  | 紫EK             | 2mL<br>微量用採血管は500μL | 2日       |                                        | 化学発光酵素免疫法                                           | 121-613                 | 121-613   | U/mL                |
| TAT                |           | 血液  | 黒CD             | 血漿300μL             | 2日       | 白線 (3mL)まで採血後直ちに氷冷提出<br>小児凝固用採血管は1mL採血 | 化学発光酵素免疫法                                           | <3                      | <3        | ng/mL               |
| トロンボモジュリン          |           | 血液  | 黒CD             |                     | 2日       |                                        | 化学発光酵素免疫法                                           | <22                     | <22       | U/mL                |
| トータルPAI-1          |           | 血液  | 黒CD             |                     | 2日       |                                        | ラテックス免疫比濁法                                          | ≤50                     | ≤50       | ng/mL               |
| 凝集能ADP 3μM         |           | 血液  | 凝集能:凝集能 (中採で採血) | 4.5mL               | 1日       | 要予約<br>3時間前より絶食<br>病棟は採取ラベル持参ください      | 光透過法 (比濁法)                                          | 57-92                   | 57-92     | %                   |
| 凝集能ADP 1μM         |           | 血液  | 凝集能:凝集能 (中採で採血) |                     | 1日       |                                        | 光透過法 (比濁法)                                          | 19-43                   | 19-43     | %                   |
| 凝集能コラーゲン 2.0μg/ml  |           | 血液  | 凝集能:凝集能 (中採で採血) |                     | 1日       |                                        | 光透過法 (比濁法)                                          | 77-92                   | 77-92     | %                   |
| 凝集能コラーゲン 0.25μg/ml |           | 血液  | 凝集能:凝集能 (中採で採血) |                     | 1日       |                                        | 光透過法 (比濁法)                                          | 0-57                    | 0-57      | %                   |
| 凝集能リストセチン          |           | 血液  | 凝集能:凝集能 (中採で採血) | 4.5mL               | 1日       |                                        | 光透過法 (比濁法)                                          | 78-98                   | 78-98     | %                   |
| 赤沈                 | 赤沈 60分値   | 血液  | 紫EK             | 2.0mL (1mL以下参考値)    | 1日       | 血算・血液像・白血球機器分類検体と併用可能                  | キャピラリー・フォトメトリー法                                     | 2-10                    | 3-15      | mm                  |

| 項目名称        |           | 検査室 | 容器名称               | 検体量 | 所要<br>日数 | 注意事項                           | 測定方法                                | 基準値範囲                                   |                                         | 单位名称     |         |       |      |
|-------------|-----------|-----|--------------------|-----|----------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------|-------|------|
|             |           |     |                    |     |          |                                |                                     | (男)                                     | (女)                                     |          |         |       |      |
| 骨<br>髄<br>像 | Pro. Erbl | 血液  | 骨髄像:骨髄像            |     |          | 要予約<br>検査部へ連絡                  | 鏡検法                                 | 0.2-1.3                                 | 0.2-1.3                                 | %        |         |       |      |
|             | Normo. B  |     |                    |     |          |                                |                                     | 0.5-2.4                                 | 0.5-2.4                                 | %        |         |       |      |
|             | Normo. P  |     |                    |     |          |                                |                                     | 17.9-29.2                               | 17.9-29.2                               | %        |         |       |      |
|             | Normo. O  |     |                    |     |          |                                |                                     | 0.4-4.6                                 | 0.4-4.6                                 | %        |         |       |      |
|             | My. Bl    |     |                    |     |          |                                |                                     | 0.2-1.5                                 | 0.2-1.5                                 | %        |         |       |      |
|             | Neu. Pro  |     |                    |     |          |                                |                                     | 0.2-4.1                                 | 0.2-4.1                                 | %        |         |       |      |
|             | Neu. Mye  |     |                    |     |          |                                |                                     | 8.2-15.7                                | 8.2-15.7                                | %        |         |       |      |
|             | Neu. Meta |     |                    |     |          |                                |                                     | 9.6-24.6                                | 9.6-24.6                                | %        |         |       |      |
|             | Neu. Stab |     |                    |     |          |                                |                                     | 9.5-15.3                                | 9.5-15.3                                | %        |         |       |      |
|             | Neu. Seg  |     |                    |     |          |                                |                                     | 6.0-12.0                                | 6.0-12.0                                | %        |         |       |      |
|             | Eos. Seg  |     |                    |     |          |                                |                                     | 1.2-5.3                                 | 1.2-5.3                                 | %        |         |       |      |
|             | Baso      |     |                    |     |          |                                |                                     | 0-0.2                                   | 0-0.2                                   | %        |         |       |      |
|             | Mono      |     |                    |     |          |                                |                                     | 0-0.8                                   | 0-0.8                                   | %        |         |       |      |
|             | Lympho    |     |                    |     |          |                                |                                     | 11.1-23.2                               | 11.1-23.2                               | %        |         |       |      |
|             | Plasma    |     |                    |     |          |                                |                                     | 0.4-3.9                                 | 0.4-3.9                                 | %        |         |       |      |
|             | Reticul   |     |                    |     |          |                                |                                     | 0-0.9                                   | 0-0.9                                   | %        |         |       |      |
|             | Megak     |     |                    |     |          |                                |                                     | 0-0.4                                   | 0-0.4                                   | %        |         |       |      |
|             | M/E       |     |                    |     |          |                                |                                     |                                         |                                         | 1.5-3.3  | 1.5-3.3 |       |      |
|             | 有核細胞数     |     |                    |     |          |                                |                                     | 1日                                      |                                         | 鏡検法(計算盤) | 10-25   | 10-25 | 万／μL |
| 骨髄巨核球数      |           |     |                    | 1日  |          | 鏡検法(計算盤)                       | 50-150                              | 50-150                                  | ／μL                                     |          |         |       |      |
| MPO染色       |           |     |                    | 1日  |          | DAB法<br>(diaminobenzidine法)    | *                                   | *                                       |                                         |          |         |       |      |
| PAS染色       |           |     |                    | 7日  |          | Schiff反応                       | *                                   | *                                       |                                         |          |         |       |      |
| D-Est染色     |           |     |                    | 7日  |          | エステラーゼ二重染色法：<br>NSE染色・SE染色     | *                                   | *                                       |                                         |          |         |       |      |
| Fe染色        |           |     |                    | 7日  |          | ベルリン青法                         | *                                   | *                                       |                                         |          |         |       |      |
| 尿素呼気試験      |           | 血液  | バッグ:生理機能<br>検査室で実施 |     | 1日       | 要予約<br>絶食で中央採血室で<br>受付をしてください。 | <sup>13</sup> C-尿素呼気試験法/<br>赤外分光分析法 | Δ <sup>13</sup> CO <sub>2</sub><br>＜2.5 | Δ <sup>13</sup> CO <sub>2</sub><br>＜2.5 | ‰        |         |       |      |
| 呼気試験判定      |           |     |                    |     |          |                                | <sup>13</sup> C-尿素呼気試験法/<br>赤外分光分析法 | (－)                                     | (－)                                     |          |         |       |      |